

5. Mesures du projet et mise en œuvre

• Description des types de SPB qui permettent de répondre aux objectifs

Type de SPB	Mesure réseau	Surtout favorable à
Prairie extensive, prairie peu intensive	- laisser 10% non fauchés - OU fauche au 1 ^{er} juillet (pour les prairies avec QII) ; - aménager des micro-structures ⁽¹⁾ en lisière (en moyenne, 1 micro-structure tous les 50 m)	- lièvre commun - faucon crécerelle - grillon champêtre - couleuvre à collier
Pâturage extensif	- pas de coupes de nettoyage ; - aménager des micro-structures en lisière (en moyenne, 1 micro-structure tous les 50 m)	- lièvre commun - couleuvre à collier
Surface à litière	- aménager des micro-structures en bordure	- couleuvre à collier
Haie, bosquet	- haie taillée par tronçons, au max. 1/3 la même année ; - bande herbeuse : laisser 10% non fauchés ; - aménager des micro-structures en bordure (en moyenne, 1 micro-structure tous les 50 m)	- pie-grièche écorcheur - bruant jaune - couleuvre à collier - lièvre commun
Jachère florale, jachère tournante	- aménager des micro-structures en bordure (1 micro-structure pour 50 ares) - OU entretien échelonné : 1/3 est broyé chaque année	- alouette des champs - faucon crécerelle - bleuet (et autres plantes ségétales)
Ourlet sur terres assolées	- évacuer le produit de la fauche - mise en place en zone déficitaire - au minimum 6 m de large	- alouette des champs - faucon crécerelle - lièvre commun
Bande culturale extensive	- mise en place pendant au moins 3 années consécutives au même endroit	- alouette des champs - bleuet (et autres plantes ségétales)
Arbre fruitier haute-tige, arbre indigène isolé	- poser des nichoirs (1 nichoir par 10 arbres)	- rougequeue à front blanc ⁽²⁾

(1) Micro-structure : tas de branches, de pierres ou de foin d'une superficie d'au moins 2 m² (définition reprise de l'Aide à l'exécution pour la mise en réseau selon l'OPD, version 1.1).

(2) Cet oiseau n'a pas été signalé dans le périmètre, mais juste à l'est seulement (carré kilométrique 569 / 182), c'est pourquoi il ne peut être retenu comme espèce cible. La pose de nichoirs, notamment dans les vergers hautes-tiges, ne peut que le favoriser.